



Anesthesie bij uw kind - Arabisch

Bij amandelen verwijderen en/of buisjes plaatsen in de oren

تخدير طفلك

استئصال اللوزتين و/أو وضع أنابيب في الأذنين

سيتم قريبًا إجراء عملية جراحية لك في مستشفى Spaarne Gasthuis. لقد ناقشت ذلك مع الطبيب. أثناء إجراء الجراحة، سوف يكون طفلك تحت تأثير التخدير العام. حيث سيقوم طبيب التخدير بإعطاء مادة التخدير العام لطفلك. طبيب التخدير هو طبيب متخصص في مختلف أشكال التخدير وتسكين الآلام والعناية المركزة المتعلقة بالجراحة. يضمن طبيب التخدير بالتعاون مع ممرضة التخدير سلامة إجراء العملية تحت التخدير.

فحص قبل الجراحة (POS)

قبل إجراء الجراحة لطفلك، سوف يتم تحديد موعد لإجراء فحص ما قبل الجراحة (POS). عادة ما يتم هذا الموعد عبر الهاتف. احرص على الحضور في الوقت المتفق عليه. يجب عليك الإجابة عن قائمة أسئلة مسبقًا. هل قمت بإنشاء حساب MijnSpaarneGasthuis لطفلك؟ يمكنك إكمال ذلك عبر الكمبيوتر. وإلا فسيتعين عليك القيام بذلك عبر استبيان ورقي. سوف تحصل على هذا الاستبيان في العيادة الخارجية للأنف والأذن والحنجرة.

في فحص ما قبل الجراحة (POS) سوف تحضر مقابلة مع أحد أفراد فريق التخدير. سوف يطرح عليك أسئلة حول أمور مثل:

- كيف كان رد فعل طفلك للتخدير، وما إذا كان طفلك قد خضع لعملية جراحية من قبل
- حالة طفلك الجسدية
- ما إذا كان طفلك يتناول أي أدوية

لأسباب تتعلق بالسلامة، سوف نطرح عليك أسئلة ربما تكون قد أجبت عنها من قبل. سوف نخبرك أيضًا بما هو مسموح به وما هو غير مسموح به قبل العملية. وسوف نشرح لك كيف سيتم تخدير طفلك من خلال الاستئصال.

بعد موعد فحص ما قبل الجراحة (POS) يمكنك الحصول على الاتفاقات التي تم الاتفاق عليها مكتوبة على الورق. هل قمت بإنشاء حساب MijnSparneGasthuis لطفلك؟ يمكنك قراءة المواعيد مرة أخرى في وقت فراغك في المساء من الساعة السابعة والنصف. اقرأها بعناية قبل العملية الجراحية بيوم. بهذه الطريقة ستأتي إلى المستشفى وأنت على أتم الاستعداد.

صيام طفلك

يجب أن تكون معدة طفلك فارغة من أجل العملية. عندما يكون طفلك تحت تأثير التخدير، يمكن أن يدخل الطعام من المعدة إلى رنتيه. لذلك لا يسمح لطفلك بتناول الطعام من الساعة 12 ليلاً قبل العملية وشرب كمية قليلة فقط. هذا ما يسمى بـ'الصيام عن الطعام والشراب'. لقد قدم لك قسم التخدير في العيادة الخارجية نصائح شخصية حول هذا الموضوع. يمكن العثور على هذه النصائح تحت عنوان "نصائح حول الطعام والشراب قبل الجراحة".

هل أكل أو شرب طفلك شيئاً غير مسموح به؟ إذن، لا يمكن إجراء العملية في ذلك اليوم. يجب علينا تحديد يوم جديد لإجراء الجراحة.

تناول الأدوية

أخبرك موظف فحص ما قبل الجراحة (POS) ما إذا كان بإمكان طفلك تناول أي أدوية لديك في صباح يوم العملية. هذا موجود في قائمة الاتفاقات قبل حوالي ساعة واحدة من ذهابك إلى المستشفى، تناول الباراسيتامول كما اتفق معك موظف فحص ما قبل الجراحة (POS) معك. وبذلك سيشرح لطفلك بألم أقل بعد العملية لأن الدواء يعمل بشكل جيد.

في المستشفى

من المريح إذا يريد طفلك اصطحاب لعبته المفضلة إلى المستشفى. ليس من الضروري إحضار البيجامة، لكن هذا ممكن بالطبع. قم بالإبلاغ عن العلاج النهاري في الوقت المنفق عليه. سوف يتم تخصيص سرير لطفلك. ستراجع ممرضة الرعاية النهارية معك بعض أسئلة السلامة. لأسباب تتعلق بالسلامة، سوف نطرح عليك أسئلة ربما تكون قد أجبت عنها من قبل. هذا لمنع، على سبيل المثال، اختلاط المرضى أو الجانب الذي سيتم إجراء العملية عليه. ثم تأخذ مقعداً في منطقة الانتظار / اللعب.

منطقة الانتظار

يتم إجراء عمليات جراحية للعديد من الأطفال. هذا يختلف من 4 إلى 7 أطفال كحد أقصى. نبدأ دائماً في العمل مع الأطفال الذين أتوا لاستئصال اللوزتين. ويأتي ذلك الأطفال الذين أتوا لوضع أنابيب في الأذنين واستئصال اللوزتين. ينتهي بنا الأمر مع أطفال توضع لهم الأنابيب فقط. ثم من صغير إلى كبير. لذلك قد يكون الطفل الأكبر سناً له الأولوية. حتى تفهم سبب حدوث ذلك.

غرفة العلاج

بمجرد أن يحين دور طفلك، سنأتي لاصطحابك ونذهب معك إلى غرفة العلاج. سنقوم باستطلاع قصير معك. هذه أسئلة سبق أن أجبت عليها من قبل. ثم نطلب من طفلك الجلوس على الكرسي المرتفع إذا كان يلزم إزالة اللوزتين فقط أو الاستلقاء على ظهره على طاولة العمليات الخاصة بالأطفال إذا تلقى طفلك (أيضاً) أنابيب. سيضع طبيب التخدير كامرة على أنف طفلك وفمه، حيث يتم دمج الأكسجين مع وسيلة مساعدة قوية للنوم. حاول طمأنة طفلك من خلال التحدث معه أو غناء أغنية. سينام طفلك بشكل سريع، على الرغم من أنك تشعر أنه يستغرق وقتاً طويلاً. ثم يبدو كما لو أن طفلك لم ينام بعد، لكنهم لا يعرفون ذلك بعد الآن. من الممكن أيضاً أن يتوتر طفلك فجأة. هذا له علاقة بعمق التخدير. لا وجود لأي ضرر، سوف يرتاح طفلك بسرعة حيث يصبح النوم أعمق.

غرفة الإنعاش

ثم تنتظر في غرفة الانتظار حتى ينتهي الطبيب من العملية. نوظف طفلك قليلاً قبل أن نأخذه إلى غرفة الإنعاش. الأطفال الذين يحصلون على الأنابيب ينامون لفترة من الوقت. ستفك الممرضة من منطقة الانتظار بمجرد انتهاء الإجراء. هل تم استئصال اللوزتين؟ قد يتقيأون بعض الدم. لا تقلق. هناك بعض الدم في المعدة وهذا يعطي شعوراً بالغثيان. ندلل الأطفال بالأيس كريم وعصير الليمون البارد. هذا لطيف جداً لالتهاب الحلق. عند انتهاء البرنامج، سيقوم الطبيب بزيارة جميع الأطفال لإعطاء القواعد والمواعيد في الأيام القليلة الأولى. يمكنك أيضاً طرح أسئلتك إذا كان لا يزال لديك أسئلة. بعد التشاور مع الطبيب، يمكنك العودة إلى المنزل مرة أخرى بالتشاور مع الممرضة. امنح طفلك مسكناً للألم في أوقات محددة لأول 3 أيام بعد العملية، خاصة بعد استئصال اللوزتين. ستخبرك المعلومات التي تلقيتها من فحص ما قبل الجراحة (POS) عن مقدار الباراسيتامول المسموح لطفلك بتناوله. شرب الماء البارد يساعد أيضاً في علاج التهاب الحلق.

أسئلة

هل لديك أسئلة بعد قراءة هذه المعلومات؟ في هذه الحالة، يرجى الاتصال بالعيادة الخارجية بين الساعة 8:00 و 16:30:

0232240165

0232248422

Vijf Meren kliniek، والحنجرة، والأذن

للمزيد من المعلومات

على الموقع <https://kids.spaarnegasthuis.nl> يمكنك مشاهدة مقاطع الفيديو مع طفلك وقراءة معلومات حول سير الأمور في المستشفى.

أين يمكنك أن تجدنا؟

Hoofddorp
Spaarnepoort 1
TM Hoofddorp2134

info@spaarnegasthuis.nl

هارلم نورد
Vondelweg 999
BW Haarlem2026

www.spaarnegasthuis.nl

هارلم زاود
Boerhaavelaan 22
RC Haarlem2035

0232240000