



Azathioprine (Imuran)

Voorgeschreven door de reumatoloog

De reumatoloog schrijft u het medicijn azathioprine (Imuran®) voor bij de behandeling van uw reumatische aandoening. Om dit medicijn goed te gebruiken, is het belangrijk dat u deze informatie goed doorleest.

Wat doet azathioprine?

Azathioprine behoort tot de groep van de immunosuppressiva. Dit zijn medicijnen die de afweer onderdrukken. Het remt de celdeling in ontstekingscellen. Hierdoor kan azathioprine ontstekingen remmen.

Azathioprine wordt voorgeschreven aan patiënten met reumatische ontstekingsziekten waarbij het afweersysteem het eigen lichaam aanvalt zoals bij:

- reumatoïde artritis
- systemische sclerose (sclerodermie)
- systemische lupus erythematosus (SLE)
- polymyositis

Meestal wordt er gestart met een lage dosering van azathioprine. Afhankelijk van hoe u het medicijn verdraagt en de bloedwaarden wordt de dosering verhoogd.

Het kan 2 tot 4 maanden duren voordat u merkt dat het begint te werken. Daarom wordt azathioprine in het begin van de behandeling vaak gegeven samen met het sneller werkende prednison.

Gebruikt u al pijnstillers? Dan kunt u deze blijven gebruiken. Werkt de azathioprine bij u goed? Dan kunt u het jarenlang blijven gebruiken.

Kan ik azathioprine gebruiken samen met andere medicijnen?

Meestal kunt u azathioprine samen met bijna alle medicijnen gebruiken. Gebruikt u azathioprine samen met Allopurinol (bij jicht)? Dan zal uw reumatoloog de hoeveelheid azathioprine aanpassen.

Vertel uw huisarts, uw specialist en de trombosedienst altijd welke medicijnen u gebruikt.

Hoe neem ik azathioprine in?

Azathioprine is er in tabletten van 25 mg, 50 mg en 75 mg. U kunt de tabletten doorslikken met voedsel, water of melk. Het is belangrijk dat u de tabletten niet breekt of kauwt, maar heel doorslikt.

Bent u de tabletten vergeten in te nemen? Neem deze dan nog dezelfde dag op een later tijdstip in.

Aanvullende informatie bij het gebruik van azathioprine

- Gebruik niet meer dan 1 alcoholconsumptie per dag. Azathioprine samen met alcohol geeft een grote kans op een slechte werking van de lever.
- Bewaar al uw medicijnen, dus ook azathioprine, altijd zó dat kinderen er niet bij kunnen.
- Heeft u tabletten over? Lever deze dan in bij de apotheek. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd.

Azathioprine en zon

Patiënten die azathioprine gebruiken, kunnen een verhoogd risico lopen op huidproblemen, waaronder ook huidkanker. Vermijd daarom als u azathioprine gebruikt een te grote blootstelling aan zonlicht en UV-straling. Wij raden hierom het gebruik van een zonnebank af. Draag beschermende kleding en gebruik zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor.

Mogelijke bijwerkingen

In de bijsluiter van de apotheek staan alle bijwerkingen van azathioprine vermeld die ooit zijn voorgekomen. De meest voorkomende bijwerkingen van azathioprine zijn:

- Maag- en darmklachten, zoals een verminderde eetlust, een vol gevoel, misselijkheid en braken of diarree.
- Huiduitslag.
- Allergische reactie op azathioprine zoals koorts, koude rillingen, spierpijn of een gele verkleuring van de huid of ogen (geelzucht).
- Erge keelpijn samen met koorts, regelmatig een bloedneus en snel blauwe plekken. Dit zijn allemaal tekenen van een storing in de bloedaanmaak.
- Soms veroorzaakt azathioprine een slechte werking van de lever. Hier merkt u niets van, maar dit wordt gezien bij een bloedonderzoek.

Neem direct contact op met uw reumatoloog of huisarts bij:

- Erge keelpijn in combinatie met koorts.
- Vaak een bloedneus.
- Snel blauwe plekken.
- Koorts, koude rillingen, spierpijn of een gele verkleuring van uw huid of ogen.

Welke controles zijn nodig tijdens de behandeling met azathioprine?

Om een eventuele slechte werking van de lever of een storing in de aanmaak van het bloed te ontdekken, zal uw reumatoloog regelmatig uw bloed laten onderzoeken. Dit gebeurt de eerste tijd meestal elke 3 weken. Hierna vinden de controles minder vaak plaats. De uitslag van de onderzoeken is na enkele dagen bij uw reumatoloog bekend. U hoeft niet te bellen of langs te

komen voor de uitslag. Uw reumatoloog neemt contact met u op als de uitslag van de onderzoeken afwijkend is.

Welke invloed heeft azathioprine op vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding?

- Azathioprine heeft geen invloed op de vruchtbaarheid van mannen en vrouwen.
- Azathioprine passeert de placenta, daarom zal het gebruik tijdens zwangerschap individueel beoordeeld moeten worden. Overweegt u een zwangerschap, overleg dan eerst met uw reumatoloog.
- Tijdens de behandeling met azathioprine mag geen borstvoeding worden gegeven.
- Mannen met een kinderwens kunnen azathioprine blijven gebruiken.

Vragen en telefoonnummers

Het is belangrijk dat u juiste en duidelijke informatie krijgt. Met deze informatie beslist u, samen met uw arts, over uw behandeling. Heeft u na het gesprek met uw reumatoloog en na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel deze dan gerust.

- Polikliniek reumatologie (023) 224 0170
- Ook kunt u contact opnemen met een reumaverpleegkundige via het telefoonnummer van polikliniek reumatologie.

Waar zijn we te vinden?

Haarlem Zuid
Boerhaavelaan 22
2035 RC Haarlem

(023) 224 0000

Haarlem Noord
Vondelweg 999
2026 BW Haarlem

www.spaarnegasthuis.nl

Hoofddorp
Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp

info@spaarnegasthuis.nl