



# Behandeling met botulinetoxine A bij een overactieve blaas

## — op de operatiekamer

### **Wat is botulinetoxine A?**

Botulinetoxine is een stof ("gif") die het overbrengen van het signaal van de zenuwvezels naar de spieren onderbreekt. De werking van botulinetoxine A kunt u vergelijken met het doorknippen van de telefoonlijn bij u thuis. Knipt u de lijn door, dan kunt u geen telefoongesprek meer voeren. Wordt het Botulinetoxine in een spier gespoten. Dan kan die spier het signaal niet meer ontvangen van de zenuwvezel en raakt verlamd.

In de urologie wordt Botulinetoxine A gebruikt voor de behandeling van een overactieve blaas en voor de behandeling van het chronische blaaspijn syndroom (Interstitiële Cystitis).

### **Hoe gaat de behandeling**

U wordt 1 dag en 1 nacht opgenomen in het Spaarne Gasthuis Haarlem Noord. Ongeveer 2 tot 3 weken na uw bezoek aan de urologie belt de polikliniek assistente urologie u over waar, wanneer en hoe laat u de afspraak heeft voor de behandeling.

De behandeling zelf gebeurt op de operatiekamer. De verpleegkundige van de afdeling brengt u naar de operatieafdeling.

De uroloog brengt een cystoscoop in de blaas. De blaas wordt gevuld met water. Hierdoor wordt de blaaswand goed zichtbaar. Door de cystoscoop brengt de uroloog een naald in uw blaas. Hiermee prikt de uroloog op meerdere plaatsen in de blaaswand een zeer kleine hoeveelheid Botulinetoxine A.

## Na de behandeling

U gaat in een bed naar de afdeling kortverblijf. U blijft daar tot de volgende dag. U heeft een katheter in de blaas. Deze wordt de volgende morgen verwijderd. Na het verwijderen van de katheter blijft op de afdeling tot u geplast heeft. Na het plassen wordt er met een echo gecontroleerd of de blaas goed leeg is. Blijft er teveel urine in de blaas achter? Dan start u meestal (kortdurend) met het zelf katheteriseren.

## Wat kunt u na de behandeling verwachten

Het effect van de behandeling is na 3 dagen tot 3 weken te merken.

Het advies is om de eerste dagen na de behandeling veel te drinken, ongeveer 2 liter per dag.

De behandeling geeft weinig of geen bijwerkingen. Soms heeft u last van:

- Bloed in de urine, vooral de eerste dagen. Heeft u na 5 dagen nog bloed in de urine, belt u dan met de polikliniek urologie.
- Een blaasontsteking. Denkt u dat u een blaasontsteking heeft, belt u dan met de polikliniek urologie.
- Een grieperig gevoel.
- Zwakte van de heupspieren.
- Heel soms komt het voor dat u niet goed kunt uitplassen. U moet uzelf dan 1 of enkele keren per dag katheteriseren. Hoe u dat doet, leert u voordat u naar huis gaat van de specialistisch verpleegkundige.
- Er kunnen ook bijwerkingen optreden, die niet in de lijst genoemd zijn. Vertel deze altijd aan uw uroloog of verpleegkundige!

Heeft u vragen of maakt u zich zorgen, belt u dan ook met de polikliniek urologie.

## Vragen en telefoonnummers

Het is belangrijk dat u juiste en duidelijke informatie krijgt. Met deze informatie beslist u, samen met uw arts, of u de behandeling laat doen. Heeft u na het gesprek met uw arts en na het lezen van de folder nog vragen, stel deze dan gerust. Schrijf uw vragen van tevoren op, zodat u niets vergeet.

Heeft u vragen, belt u dan op werkdagen naar de poli urologie (023) 224 0160

Heeft u vragen of problemen na de behandeling belt u:

- Overdag met de poli urologie (023) 224 0160
- In de avond, nacht of het weekend belt u de:
  - afdeling spoedeisende hulp Haarlem Zuid: (023) 224 4880
  - afdeling spoedeisende hulp Hoofddorp (023) 224 6880

## Waar zijn we te vinden?

### Haarlem Zuid

Boerhaavelaan 22  
2035 RC Haarlem

(023) 224 0000

### Haarlem Noord

Vondelweg 999  
2026 BW Haarlem

[www.spaarnegasthuis.nl](http://www.spaarnegasthuis.nl)

### Hoofddorp

Spaarnepoort 1  
2134 TM Hoofddorp

[info@spaarnegasthuis.nl](mailto:info@spaarnegasthuis.nl)