



Blokkade van het ganglion stellatum

bij opvliegers en overmatig zweten

U krijgt binnenkort een ganglion stellatum blokkade. Het ganglion stellatum ligt in de hals, laag naast de zevende nekwervel en kan makkelijk met een naald benaderd worden. Een ganglion stellatum is een zenuwknoop, die prikkels doorgeeft aan de zenuwen over de hormoonhuishouding. Hij regelt ook de bloeddoorstroming. Als de regeling verstoord is, veroorzaakt dit overmatig zweten en opvliegers. U kunt hiervoor een behandeling krijgen op de pijnpoli.

Welke voorbereiding is nodig

Bloed verdunnende medicijnen

- Gebruikt u bloed verdunnende medicijnen? Vertel dit dan aan de arts. De arts bespreekt met u of u voor de behandeling tijdelijk moet stoppen met deze medicijnen.
- Gebruikt u Marcoumar en Acenocoumarol? De INR moet op de dag van de behandeling lager dan 1,7 zijn. Geef dit door aan de trombosedienst.

Allergieën

Heeft u een allergie? Bijvoorbeeld voor jodium, een contrastmiddel of andere medicijnen? Geef dit dan door aan de arts of de verpleegkundige.

Zwanger

Bent u zwanger of bestaat de kans dat u zwanger bent, geeft dit dan voor de behandeling door aan de arts. Tijdens de behandeling worden röntgenstralen gebruikt.

Hoe gaat de behandeling

Tijdens de behandeling ligt u op uw rug op de behandeltafel. U krijgt de injectie in uw hals, meestal aan de rechterkant. Met behulp van een verdovende vloeistof of een warmte-behandeling wordt de zenuwknoop verdoofd. Hierdoor wordt de prikkel naar de hersenen onderbroken. De behandeling kan een paar maanden tot een half jaar werken.

Na de behandeling

Na de behandeling neemt u plaats in de ruimte naast de behandelkamer. De verpleegkundige of doktersassistente controleert u en geeft u informatie over wat u thuis kunt verwachten. Omdat u een tijdelijk verdoofd gevoel kunt hebben, mag uw 24 uur na de behandeling niet actief deelnemen aan het verkeer (fietsen/autorijden). Reizen met het openbaar vervoer mag wel. Soms ervaren patiënten napijn na de behandeling. Deze pijn kan 1 tot 2 weken aanhouden.

Complicaties en bijwerkingen

Ondanks het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling bestaat er een kleine kans op een complicatie of een bijwerking. Dit kan zijn:

- Heesheid. Dit kan enkele uren duren.
- Slikklachten, deze duren maar kort.
- Kortademigheid en hoesten. Dit komt zeer zelden voor. Neemt de kortademigheid binnen 24 uur na de behandeling ernstig toe? Neem dan direct contact op met het pijncentrum of met de afdeling spoedeisende hulp. U kunt een klaplong hebben.
- Na de behandeling kunt u een verdoofd gevoel in het behandeld gebied hebben. Dit komt door de verdoving en is tijdelijk.
- Een warm gevoel in uw nek, wang of arm.
- Een hangend rechter ooglid. Ook dit is tijdelijk en komt door de verdoving
- Een bloeduitstorting. Dit kan ontstaan als er een bloedvatje geraakt is tijdens de behandeling. Dit veroorzaakt een blauwe plek en soms ook napijn.
- Spierpijn op de plaats waar geprikt is.
- De injectie kan irritatie en pijn geven. Dit heet napijn. Napijn kan 1 tot 2 weken duren.
- Een infectie. Krijgt u koorts (boven 38,5 C), neem dan contact op met het pijncentrum of met uw huisarts.

Controleafspraak

Het resultaat van de behandeling is pas na enkele dagen tot weken goed te beoordelen. Meestal bellen wij u na enkele weken om te vragen hoe het met u gaat. De verpleegkundige of doktersassistente vertelt u wanneer u gebeld wordt. Een enkele keer wil de arts u terug zien op het spreekuur of belt hij u zelf.

Tenslotte

Wij kunnen niet garanderen dat u van de klachten afkomt. Het kan zijn dat uw klachten niet via onze technieken behandeld kunnen worden.

Contact

Heeft u vragen, belt u dan het pijnpoli:

- van maandag t/m vrijdag van 8.00 – 16.00 uur (023) 224 0190

Waar zijn we te vinden?

Haarlem Zuid

Boerhaavelaan 22
2035 RC Haarlem

(023) 224 0000

Haarlem Noord

Vondelweg 999
2026 BW Haarlem

www.spaarnegasthuis.nl

Hoofddorp

Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp

info@spaarnegasthuis.nl