



Blokkade van het ganglion van Impar

Het ganglion van Impar is een zenuwknoop van het onwillekeurige zenuwstelsel. De knoop ligt bij de overgang van het heiligbeen (sacrum) naar het staartbeen (os coccyx). Hij zorgt voor het gevoel in het staartbotje en rond de anus. Door het blokkeren van het ganglion van Impar kunnen pijnklachten aan het staartbot, endeldarm, geslachtsorganen en/of rond de anus verminderen.

Welke voorbereiding is nodig

Bloed verdunnende medicijnen

- Gebruikt u bloed verdunnende medicijnen? Vertel dit dan aan de arts. De arts bespreekt met u of u voor de behandeling tijdelijk moet stoppen met deze medicijnen.
- Gebruikt u Marcoumar en Acenocoumarol? De INR moet op de dag van de behandeling lager dan 1,7 zijn. Geef dit door aan de trombosedienst.

Allergieën

Heeft u een allergie? Bijvoorbeeld voor jodium, een contrastmiddel of andere medicijnen? Geef dit dan door aan de arts, de verpleegkundige of doktersassistente.

Zwanger

Bent u zwanger of bestaat de kans dat u zwanger bent, geef dit dan door voor de behandeling aan de arts. Tijdens de behandeling worden röntgenstralen gebruikt.

Hoe gaat de behandeling?

U neemt plaats op uw buik op de behandeltafel.

De arts brengt onder röntgendoorlichting een naald bij de bilnaad in naar het ganglion Impar. Zodra de naald op de juiste plaats zit, spuit de arts de medicijnen in en doet eventueel de warmtebehandeling (PRF).

Na de behandeling

Na de behandeling neemt u plaats in de ruimte naast de behandelkamer. De verpleegkundige of doktersassistente controleert u en geeft u informatie over wat u na de behandeling thuis kunt verwachten. U kunt na de behandeling een tijdelijk verdoofd gevoel in het behandelend gebied hebben. Daarom mag u 24 uur niet actief deelnemen aan het verkeer (fietsen/autorijden). Reizen met openbaar vervoer mag wel. Sommige patiënten ervaren napijn. Deze pijn kan 1 week tot 2 weken aanhouden.

Complicaties en bijwerkingen

Ondanks het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling bestaat er een kleine kans op een complicatie of een bijwerking. Dit kan zijn:

- U kunt na de behandeling een verdoofd gevoel krijgen in het behandelde gebied. Dit komt door de verdoving, maar is tijdelijk.
- U kunt napijn voelen. De pijn kan één tot twee weken aanhouden, maar is tijdelijk.
- U kunt een bloeding krijgen wanneer er een bloedvatje is geraakt. Dit geeft een blauwe plek en soms wat pijn.
- U kunt spierpijn krijgen op de plaats waar geprikt is.
- U kunt een infectie krijgen. Heeft u koorts (lichaamstemperatuur boven 38,5 C), neem dan contact op met het pijncentrum of met uw huisarts.
- Zijn er ontstekingsremmers (corticosteroïden) ingespoten, dan kunt u de eerste dagen na de behandeling de volgende bijwerkingen hebben: hoofdpijn, een rood of warm gezicht, opvliegers, onregelde menstruatie, spierkrampen of een verhoogde bloedsuikerspiegel.
- Gebruikt u de pil en bent u behandeld met een ontstekingsremmer (corticosteroïden)? De anticonceptiepil kan in de maand dat u de behandeling krijgt niet betrouwbaar zijn. Zorg voor een ander betrouwbaar anticonceptiemiddel in die maand.

Controle afspraak

Het resultaat van de behandeling is pas na enkele dagen tot weken goed te beoordelen. Meestal bellen wij u na enkele weken om te vragen hoe het met u gaat. De verpleegkundige of doktersassistente vertelt u wanneer u gebeld wordt. Een enkele keer wil de arts u terug zien op het spreekuur.

Tenslotte

Wij kunnen niet garanderen dat u van de pijn afkomt. Het kan zijn dat uw klachten niet via onze technieken behandeld kunnen worden. De behandeling van pijnklachten die al langere tijd bestaan, is vaak een lastig verlopend proces. Wij doen alles wat mogelijk is om uw pijnklachten te verminderen.

Contact

Heeft u vragen, belt u dan het pijncentrum:

- van maandag t/m vrijdag van 8.00 – 16.00 uur (023) 224 0190

Waar zijn we te vinden?

Haarlem Zuid

Boerhaavelaan 22
2035 RC Haarlem

(023) 224 0000

Haarlem Noord

Vondelweg 999
2026 BW Haarlem

www.spaarnegasthuis.nl

Hoofddorp

Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp

info@spaarnegasthuis.nl