



Locoregionale anesthesie - Plexusblokkade - Arabisch

(العصب إحصار) الضفيرة إحصار الموضعي التخدير

التخدير الموضعي

عند استخدام التخدير الموضعي، يتم تجريد جزء من الجسم مؤقتاً من الإحساس و الحركة. كالأذراع مثلاً أو الجزء السفلي من الجسم بالكامل. عن طريق حقن مخدر حول العصب، يمكن تعطيل الأعصاب أو المسارات العصبية مؤقتاً. عند استخدام هذا النوع من التخدير، يمكنك البقاء مستيقظاً أثناء العملية. كما أنه و بالتشاور مع طبيب التخدير أو ممرضة التخدير، يمكنك أيضاً طلب وسيلة مساعدة على النوم (التهدئة) أثناء العملية. نتيجة لذلك لن تشعر بأي شيء أثناء العملية. لن تتمكن من رؤية أي شيء أثناء العملية، لأن كل شيء مغطى بالستائر.

تخضع للتخدير الموضعي عن طريق الحقن. المكان التي ستحصل فيه على الحقنة راجع إلى الطرف من الجسم الذي ستجرى فيه العملية. سيقوم طبيب التخدير بإرشادك بمساعدة من ممرضة التخدير أو ممرضة غرفة العمليات المركزية (هولدينغ) أثناء حقن هذا المخدر. سيشرحون لك كل ما يحدث. قبل خضوعك للعملية الجراحية، يتطلب الأمر بعض الوقت لكي يؤدي المخدر مفعوله. يمكن أن يتطلب ذلك وقتاً يتراوح من بضع دقائق إلى ساعة أو ساعة ونصف وذلك حسب نوع التخدير.

تقنيات التخدير الموضعي المختلفة

هناك العديد من تقنيات التخدير الناحي مثل:

- حصار ببير (التخدير الوريدي الموضعي)
- التخدير النخاعي (إبرة الظهر)
- تخدير فوق الجافية (تخدير الإبيديورال)
- إحصار الضفيرة

إحصار الضفيرة (إحصار العصب)

يتم إعطاء مخدر إحصار الضفيرة كمسكن إضافي للألم بالإضافة إلى التخدير العام أو حقنة الظهر ولتسكين الألام بعد الجراحة. يمكن أن يعمل هذا المخدر لمدة 12 ساعة وأحياناً أكثر من 36 ساعة بعد العملية. لذلك لا تحتاج بعد العملية مباشرة إلى لنسبة قليلة من مسكن الألم. يُعطى هذا الشكل من التخدير بشكل أساسي في العمليات الصغيرة نسبياً ولكنها تكون عمليات مؤلمة للغاية، حيث يمكنك العودة إلى المنزل على المدى القصير. كالعلاجات التي تُجرى خلال العلاج النهاري أو إقامة قصيرة بالمستشفى.

سيتم وصلك بجهاز المراقبة وسيتم قياس ضغط دمك بانتظام. يُعطى مخدر إحصار الضفيرة عن طريق الحقن. بمساعدة جهاز الموجات فوق الصوتية، يتم البحث عن العصب المؤدي إلى منطقة الجراحة. كمثال على ذلك إعطاء حقنة في الجهة الخلفية للركبة لإجراء عملية جراحية في القدم. يستطيع طبيب التخدير حقن المخدر بدقة متناهية بالقرب من العصب. يستغرق المخدر بعض الوقت ليعمل بشكل صحيح. غالباً ما يتم إعطاؤك شكلاً آخر من أشكال التخدير قبل العملية مباشرة، مثل التخدير فوق الجافية أو التخدير العام أو مادة منومة خفيفة (التهديئة).

الآثار الجانبية ومضاعفات إحصار الضفيرة

المخدر

أحياناً لا يعمل المخدر بشكل كافٍ. يمكن لطبيب التخدير في هذه الحالة أن يختار زيادة مخدر إضافي أو يصف شكلاً آخر من أشكال تسكين الألام لما بعد العملية.

المنطقة المخدرة

يمكن أن يظهر هناك تورم دموي على منطقة الحقن. يحدث ذلك بسبب إحداث ثقب في الوعاء الدموي.

رد فعل تحسسي

احتمال ظهور رد فعل تحسسي تجاه الأدوية التي نقدمها احتمال وارد دائماً. الشعور بحكة في الجلد أو ظهور نتوءات هي أمثلة على ذلك. إلا أن ذلك لا يحدث إلا نادراً جداً.

المخدر في مجرى الدم

في حالات نادرة جداً، يمكن أن يتم اختراق أحد الأوعية الدموية أثناء الحقن، مما يتسبب في دخول كمية قليلة من المخدر إلى مجرى الدم مباشرةً. يعاني المريض من تنميل في المنطقة المحيطة بالفم وطعم معدني يزداد سوءاً في الفم وفقدان الإحساس في الفم واللسان. تفاقم هذه الأعراض يؤدي إلى الشعور بالتوتر والارتباك والاضطراب والرعشة وفقدان السيطرة وعدم انتظام ضربات القلب وفقدان الوعي في بعض الأحيان. هل تشعر بأي من هذه الآثار الجانبية؟ أبلغ بذلك في أسرع وقت ممكن.

يمكن أن يشعر المريض بالألم في مكان الحقن. عادة ما تخففي هذه الشكاوى في غضون أيام قليلة. تريد ألا تشعر بشيء أثناء العملية؟ يمكنك عندئذ طلب الحصول على مادة منومة. يُفق معك على ذلك مسبقاً. وبالتالي ستحصل على التهديئة.

التهديئة (تسكين الألم)

إذا كنت بحاجة للتهديئة، يمكنك طلب الحصول على مادة منومة أثناء العملية. تسمى هذه المادة المنومة بالتهديئة أو "roesje" وسيتم إعطاؤك إياها من خلال الإبرة الوريدية. تعمل هذه المادة على تقليل إحساسك بالزمان والمكان وتجعلك تشعر بالنعاس وتكون شبه نائم. ونتيجة لذلك، لن تشعر بأي شيء أثناء العملية. سيقل شعورك بالانزعاج، كالتوتر مثلاً والخوف والألم.

التهديئة والتخدير العام شيئان مختلفان

خضوعك للتهديئة لا يعني أنك خاضع للتخدير العام. تحتفظ بحركاتك اللاإرادية المهمة مثل السعال والبلع ويمكنك التنفس بمفردك بشكل عادي.

المضاعفات والآثار الجانبية للتهديئة

نادرا ما تحدث أي آثار جانبية أو مضاعفات نتيجة التهديئة. يمكن الشعور بالغثيان كأثر جانبي للأدوية أو العلاج. إذا شعرت بالغثيان، أخبر طبيب التخدير أو ممرضة التخدير أو الممرضة بذلك.

أين توجد مقرائنا؟

Haarlem Zuid
Boerhaavelaan 22
2035 RC Haarlem
(023) 224 0000

Haarlem Noord
Vondelweg 999
2026 BW Haarlem
www.spaarnegasthuis.nl

Hoofddorp
Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp
info@spaarnegasthuis.nl