



Lokale anesthesie

Plaatselijke verdoving

Bij lokale anesthesie krijgt u een plaatselijke verdoving. De plaatselijke verdoving krijgt u door een injectie (prik) met een verdovend middel. Het gebied wat geopereerd gaat worden, wordt dan verdoofd.

Wanneer krijgt u een plaatselijke verdoving

- Een plaatselijke verdoving wordt meestal gegeven bij kleinere operaties die op de polikliniek gedaan worden. Deze verdoving geeft u voldoende pijnstilling tijdens de operatie.
- Vaak geeft de anesthesioloog deze extra plaatselijke verdoving bovenop de vorm van anesthesie die met u is besproken. Deze is dan bedoeld als extra pijnstilling van het operatiegebied. Bijvoorbeeld wanneer u diezelfde dag weer naar huis mag.
- Een plaatselijke verdoving kan ook extra gegeven worden als de zenuwblokkade, die u gekregen hebt op de operatieafdeling, onvoldoende werkt.

Bijwerkingen en complicaties van lokale anesthesie

Pijn

Als de verdoving uitwerkt kunt u pijn krijgen in het gebied waar u geopereerd bent.

Allergische reactie

Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen er altijd complicaties ontstaan, zoals bijvoorbeeld een allergische reactie op medicijnen.

Waar zijn we te vinden?

Haarlem Zuid

Boerhaavelaan 22
2035 RC Haarlem

(023) 224 0000

Haarlem Noord

Vondelweg 999
2026 BW Haarlem

www.spaarnegasthuis.nl

Hoofddorp

Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp

info@spaarnegasthuis.nl