



Lokale anesthesie - Plaatselijke verdoving - Arabisch

موضعي مخدر - موضعي تخدير

في حالة استخدام التخدير الموضعي ستتلقى مخدرًا موضعيًا. يتم إعطاء المخدر الموضعي عن طريق حقنة (وخز) بمادة مخدرة. يتم تخدير المنطقة التي سيتم إجراء العملية عليها.

متى ستمنح مخدرًا موضعيًا؟

- غالبًا ما يتم استخدام المخدر الموضعي في العمليات البسيطة التي يتم إجراؤها في العيادة الخارجية. يمنحك هذا المخدر تسكينًا كافيًا للألم أثناء العملية.
- غالبًا ما يقوم طبيب التخدير بمنح هذا التخدير الموضعي بالإضافة إلى نوع التخدير الذي تمت مناقشته معك. وهو عبارة عن مسكن ألم إضافي لمنطقة العملية. وذلك عندما يُسمح لك بالعودة إلى المنزل في نفس اليوم.
- يمكن أيضًا إعطاء مخدر موضعي إضافي إذا كان تخدير إحصار العصب، الذي تلقينته في قسم الجراحة، لا يعمل بشكل كافٍ.

الآثار الجانبية ومضاعفات التخدير الموضعي

الألم

إذا انتهى مفعول المخدر، يمكنك أن تشعر بالألم في المنطقة التي أجريت فيها الجراحة.

رد الفعل التحسسي

على الرغم من العناية بكل التفاصيل، يمكن أن تظهر هناك مضاعفات، مثل رد فعل تحسسي للأدوية.

أين توجد مقراتنا؟

Haarlem Zuid

Boerhaavelaan 22
2035 RC Haarlem

+31 (0)23 224 0000

Haarlem Noord

Vondelweg 999
2026 BW Haarlem

www.spaarnegasthuis.nl

Hoofddorp

Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp

info@spaarnegasthuis.nl