



Blokkade van de plexus coeliacus

Een plexus is een netwerk van zenuwen. De plexus coeliacus ligt in de bovenbuikholte voor de wervelkolom. Blokkade van de plexus coeliacus is een behandeling bij pijn door kanker aan de bovenbuikorganen zoals de maag, lever en de alvleesklier. Soms wordt de blokkade ook aangebracht bij een ontstoken alvleesklier (pancreatitis). Om uw klachten te verminderen krijgt u binnenkort deze blokkade.

Welke voorbereiding is nodig

Bloed verdunnende medicijnen

- Gebruikt u bloed verdunnende medicijnen? Vertel dit dan aan de arts. De arts bespreekt met u of u voor de behandeling tijdelijk moet stoppen met deze medicijnen.
- Gebruikt u Marcoumar en Acenocoumarol? De INR moet op de dag van de behandeling lager dan 1,7 zijn. Geef dit door aan de trombosedienst.

Allergieën

Heeft u een allergie? Bijvoorbeeld voor jodium, een contrastmiddel of andere medicijnen? Geef dit dan door aan de arts, verpleegkundige of doktersassistente.

Zwanger

Bent u zwanger of bestaat de kans dat u zwanger bent, geeft dit dan voor de behandeling door aan de arts. Tijdens de behandeling worden röntgenstralen gebruikt.

Eten en drinken op de dag van de behandeling

- Krijgt u een roesje en de behandeling in de ochtend? Dan moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u niet meer mag eten **vanaf 24.00 uur** in de nacht voor de behandeling tot na

de behandeling. U mag **tot 2 uur** voor de behandeling alleen heldere vloeistoffen drinken (thee, water, limonade of zwarte koffie zonder melk).

- Krijgt u een roesje en de behandeling in de middag? U mag dan **tot 6 uur** voor de behandeling als ontbijt 2 beschuiten eten en een kopje thee drinken. Daarna mag u **tot 2 uur** voor de behandeling alleen heldere vloeistoffen drinken (thee, water, limonade of zwarte koffie zonder melk).
- Krijgt u geen roesje, dan mag u gewoon eten en drinken.

Op de dag van de behandeling

Op de dag van de behandeling komt u op het afgesproken tijdstip naar de pijnpoli. Van te voren is met u besproken waar u zich moet melden

Behandeling

U gaat op uw buik liggen op de behandeltafel. Vervolgens bepaalt de arts via röntgendoorlichting de insteekplaats van de naalden in uw rug. Hij controleert de positie van de naald met behulp van contrastmiddel. Daarna spuit hij de medicijnen in. De behandeling duurt ongeveer een half uur. Sommige patiënten vinden het vervelend of te pijnlijk om op hun buik te liggen. Zij kunnen dan een roesje krijgen via een infuus. Zij ervaren de behandeling dan meer ontspannen. Het sedatieteam assisteert de arts hierbij.

Na de behandeling

Na de behandeling gaat u naar de uitslaapkamer van de pijnpoli tot u goed wakker bent. De verpleegkundige geeft u informatie over wat u na de behandeling thuis kunt verwachten. Daarna gaat u terug naar de afdeling.

Complicaties en bijwerkingen

Ondanks het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling bestaat er een kleine kans op een complicatie of een bijwerking. Dit kan zijn:

- een heftige diarree.
- een verdoofd gevoel krijgen in het behandelde gebied voorkomen. Dit komt door de verdoving, maar is tijdelijk.
- een bloeding krijgen wanneer er een bloedvatje is geraakt tijdens de behandeling. Hierdoor krijgt u een blauwe plek en soms napijn.
- spierpijn op de plaats waar de arts heeft geprikt.
- Bij elke behandeling is er een kleine kans op een infectie. Krijgt u koorts (lichaamstemperatuur boven 38,5°C), neem dan contact op met het pijncentrum of met uw huisarts.
- Zijn er ontstekingsremmers (corticosteroiden) ingespoten, dan kunt u de eerste dagen na de behandeling de volgende bijwerkingen krijgen: hoofdpijn, een rood of warm gezicht, opvliegers, onregelde menstruatie, spierkrampen of een verhoogde bloedsuikerspiegel. Deze bijwerkingen zijn tijdelijk.
- Gebruikt u de pil en bent u behandeld met een ontstekingsremmer (corticosteroiden)? De anticonceptiepil kan in de maand dat u de behandeling krijgt niet betrouwbaar zijn. Zorg voor een ander betrouwbaar anticonceptiemiddel in die maand.

Controle afspraak

Het resultaat van de behandeling is pas na enkele dagen tot weken goed te beoordelen. Na een aantal weken heeft u of een controleafspraak met uw arts op de pijnpoli en bespreekt u samen het resultaat van de behandeling. Of de arts belt u op.

Tenslotte

Wij kunnen niet garanderen dat u van de pijn afkomt. Het kan zijn dat uw klachten niet via onze technieken behandeld kunnen worden. De behandeling van pijnklachten die al langere tijd bestaan, is vaak een lastig verlopend proces. Wij doen alles wat mogelijk is om uw pijnklachten te verminderen.

Contact

Heeft u vragen, belt u dan de pijnpoli:

- van maandag t/m vrijdag van 8.00 – 16.00 uur (023) 224 0190

Waar zijn we te vinden?

Haarlem Zuid

Boerhaavelaan 22
2035 RC Haarlem

(023) 224 0000

Haarlem Noord

Vondelweg 999
2026 BW Haarlem

www.spaarnegasthuis.nl

Hoofddorp

Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp

info@spaarnegasthuis.nl