



Provocatietest bij een vermoeden op allergieën

— medicijnen - enkele dosis

U heeft een allergische reactie gehad op een medicijn. Omdat het niet zeker is of u allergisch bent, krijgt u een provocatietest. Bij deze test krijgt u één keer een kleine hoeveelheid van een bepaald medicijn. Omdat u het medicijn één keer krijgt, heet deze test single dose provocatietest. Uw arts of verpleegkundig specialist heeft dit met u besproken.

Vorbereiden op het onderzoek

- U mag niet ziek zijn, zoals bij griep, koorts, benauwdheid of een erge verkoudheid. Twijfelt u? Bel dan poli allergologie voordat u komt.
- Gebruikt u medicijnen tegen allergieën? Overleg dan of u deze tijdelijk moet stoppen.
- U mag van tevoren gewoon eten en drinken.
- Aanpassen van uw medicijnen. Zie de alinea 'Wat u moet doen met uw medicijnen'.

Waar krijgt u de test?

U komt naar polikliniek allergologie op locatie Haarlem Zuid. Bij aankomst in het ziekenhuis meldt u zich aan via uw MijnSpaarneGasthuis-app. Gebruikt u de app niet? Meld u zich dan bij de inschrijfbalie in de centrale hal van het ziekenhuis.

Hoe gaat de test?

- Bij een provocatietest met medicijnen zorgt het ziekenhuis voor de medicijnen. Tenzij de arts dit anders met u heeft afgesproken.
- U neemt het medicijn in.

- Daarna gaat u naar de wachtkamer..
- De doktersassistenten zitten achter de balie. Vanuit deze werkplek kunnen zij u zien hoe het met u gaat.
- Krijgt u klachten? Geef dit dan direct door aan de doktersassistenten.
- Krijgt u een ernstige reactie? Deze kunnen wij direct behandelen. Medicijnen en hulpmiddelen zijn aanwezig.
- U blijft op de polikliniek tot de klachten over zijn of duidelijk minder worden.
- De test duurt minimaal 2 uur.
Houd hier rekening mee. Neem iets mee zodat u wat te doen heeft tijdens het wachten, zoals een boek of tablet.
- De doktersassistent vertelt u wanneer de test klaar is en u naar huis kunt gaan.

Waar houdt u rekening mee tijdens de test?

- U mag de ruimte niet verlaten tijdens de test.
- Krijgt u klachten? Vertel dit dan meteen aan doktersassistent die u in de gaten houdt.
- Wilt u naar het toilet, vertelt u dit dan ook aan deze medewerker

De uitslag

U krijgt een telefonische afspraak met de arts die de test heeft aangevraagd. Deze arts bespreekt de uitslag met u.

U bent allergisch

Blijkt uit de test dat u allergisch bent? Dan krijgt u het advies om dit medicijn niet meer te gebruiken. U krijgt informatie over medicijnen, die u wel kunt gebruiken.

U bent niet allergisch

Blijkt uit de test dat u niet allergisch bent? Dan kunt u het medicijn weer gebruiken. Sommige mensen blijven bang om het weer te nemen. Heeft u dit ook? Bespreek dit dan met uw allergoloog en/of verpleegkundig specialist.

Eigen vervoer

Sommige medicijnen kunnen u suf maken, zoals sterke pijnstillers of opiaten. Hierdoor kunt u zich minder alert voelen. Vraag daarom iemand om u naar huis te brengen. Ook antihistaminica kan uw rijden beïnvloeden. Voelt u zich niet veilig om zelf te rijden? Ga dan niet autorijden.

Wat moet u doen met uw medicijnen?

- Sommige medicijnen beïnvloeden de test. De arts bespreekt met u welke medicijnen u moet stoppen en welke u mag blijven gebruiken.
- Gebruikt u luchtwegverwijders (puffers voor de longen) en neusspray tegen hooikoorts? Deze medicijnen mag u gewoon gebruiken. Neem deze mee naar de test.
- Gebruikt u antibiotica en/of prednison? Belt u dan met de polikliniek en vraag of u deze medicijnen mag gebruiken.
- Twijfelt u over andere medicijnen? Bel de polikliniek.
- Op de laatste pagina deze folder vindt u een lijst van medicijnen waarmee u **moet** stoppen voor de provocatietest.

Contact

Heeft u na het lezen van deze folder vragen? Neem dan contact op met de polikliniek interne geneeskunde op telefoonnummer (023) 224 0050. Vraag naar een doktersassistente van allergologie. Als dat nodig is, overleggen zij met de allergoloog of verpleegkundig specialist allergologie.

Overzicht van medicijnen waarmee u moet stoppen

U moet stoppen met onderstaande medicijnen voor de provocatietest. Antihistaminica mag u 72 uur vóór het onderzoek niet meer innemen.

Stofnaam	Geneesmiddel
acrivastine	Semprex
cetirizine	Allergietablet Cetirizine, Prevalin allerstop, Reactine, Zyrtec
chloorcyclizine/cinnarizine	Primatour
cinnarizine	Cinnarizine
clemastine	Clemastine, Tavegyl
cyclizine	Cyclizine tablet, Cyclizine zetpil FNA
desloratadine	Aerius, Desloratadine, Neoclarityn
dimetindeen	Fenistil
doxylamine/pyridoxine	Xonvea
ebastine	Ebastine, Kestine
fexofenadine	Allegra fexotabs, Fexofenadine, Telfast
hydroxyzine	Hydroxyzine
ketotifen (systemisch)	Ketotifen stroop, Zaditen
levocetirizine	Levocetirizine, Xyzal
loratadine	Allerfre, Loratadine, Claritine
meclozine	Suprimal
meclozine/pyridoxine	Emesafene
mizolastine	Mizollen
oxomemazine	Toplexil
promethazine	Promethazine tablet, Promethazine stroop
rupatadine	Rupafin, Rupatadine

Bètablokkers - Niet innemen in de ochtend op de dag van de test

Stofnaam	Geneesmiddel
acebutolol	Acebutolol
atenolol	Atenolol
bisoprolol	Bisoprolol, Emscor
carvedilol	Carvedilol
celiprolol	Celiprolol
labetalol	Labetalol tablet, Trandate
metoprolol	Metoprolol, Selokeen
nebivolol	Nebilet, Nebivolol
pindolol	Pindolol
propranolol	Propranolol, Propranololdrank FNA, Hemangiol
sotalol	Sotalol