



# Sulfasalazine (Salazopyrine)

## voorgeschreven door de reumatoloog

De reumatoloog schrijft u het medicijn Sulfasalazine voor bij de behandeling van uw reumatische aandoening. Om dit medicijn goed te gebruiken, is het belangrijk dat u deze informatie goed doorleest.

### **Wat doet Sulfasalazine?**

Medicijnen nemen de oorzaak van reumatische aandoeningen niet weg. Wel zijn er medicijnen die deze aandoeningen rustiger kunnen maken. Dit noemen wij reuma bestrijdende medicijnen. Na enige tijd nemen hierdoor uw klachten af zoals pijn, stijfheid en zwelling van de gewrichten. Sulfasalazine is zo'n medicijn. Het kan twee tot drie maanden duren voordat u merkt dat het begint te werken.

Gebruikt u al pijnstillers? Dan kunt u deze blijven gebruiken. Werkt de Sulfasalazine bij u goed? Dan kunt u het jarenlang blijven gebruiken.

Helaas werkt het niet bij iedereen even goed. Werkt het bij u niet goed of heeft u veel last van bijwerkingen? Dan kan de reumatoloog het medicijn weer stoppen.

Sulfasalazine wordt ook gebruikt bij chronische darmziekten zoals de ziekte van Crohn en Colitis ulcerosa.

### **Kan ik Sulfasalazine gebruiken samen met andere medicijnen?**

U kunt Sulfasalazine samen met bijna alle medicijnen gebruiken.

Er zijn een paar medicijnen die invloed hebben op de werking van Sulfasalazine:

- sommige antibiotica

- ijzertabletten
- bloedverduunners (Sintrom(mitis), Marcoumar)
- digoxine (harttablet)
- foliumzuur (een vitamine)
- tabletten bij diabetes

Vertel uw huisarts en uw specialist daarom altijd welke medicijnen u gebruikt.

## Hoe neem ik Sulfasalazine in?

Sulfasalazine is er in tabletten van 500 mg. U start met een opbouwschema. Dat wil zeggen dat u de hoeveelheid van het medicijn langzaam verhoogd. U ziet hieronder het schema van vier weken.

<i>Opbouwschema</i>	<i>Ochtend</i>	<i>Avond</i>
Week 1	0 tabletten	1 tablet
Week 2	1 tablet	1 tablet
Week 3	1 tablet	2 tabletten
Week 4 en daarna	2 tabletten	2 tabletten

U kunt de tabletten het beste innemen tijdens de maaltijd. Dus met voedsel, water of melk. Het is belangrijk dat u de tabletten niet breekt of kauwt, maar heel doorslikt. Bent u de tabletten vergeten in te nemen? Neem deze dan later op dezelfde dag nog in. Wees voorzichtig met alcoholgebruik. Alcohol samen met Sulfasalazine geeft maagklachten.

## Mogelijke bijwerkingen

In de bijsluiter van de apotheek staan alle bijwerkingen van Sulfasalazine, die ooit zijn voorgekomen. De meest voorkomende zijn:

- Misselijkheid, hoofdpijn of duizeligheid, soms duifheid.
- Huiduitslag
- Ontstekingen in het slijmvlies van de mond, zoals pijnlijke plekjes.
- Een verandering van uw stemming.
- Uw urine kan een oranje-rode kleur krijgen. Dit is onschuldig en gaat vanzelf over als u de tabletten niet meer slikt.

Heeft u veel last van de bijwerkingen? Neem dan contact op met uw reumatoloog.

Soms heeft de Sulfasalazine invloed op de werking van uw lever. Hier merkt u zelf niets van. Dit is wel aan te tonen met een bloedonderzoek.

## Neem direct contact op met uw reumatoloog of huisarts bij:

- huiduitslag
- ontstekingen van het mondslijmvlies
- flinke keelpijn in combinatie met koorts
- herhaaldelijke bloedneuzen
- snel blauwe plekken

## Welke controles?

Uw reumatoloog laat regelmatig uw bloed controleren vanwege:

- De invloed van de Sulfasalazine op de werking van uw lever.
- De invloed van de Sulfasalazine in de aanmaak van uw bloedcellen.

In de eerste tijd is dit meestal elke drie weken. Later worden de controles minder vaak gedaan. De uitslag van het onderzoek is na enkele dagen bij uw reumatoloog bekend. U hoeft

niet te bellen of langs te komen voor de uitslag. Uw reumatoloog neemt contact met u op als de uitslag van de onderzoeken afwijkend is.

### **Welke invloed heeft Sulfasalazine op vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding?**

- Sulfasalazine heeft geen invloed op vruchtbaarheid van vrouwen.
- Bij mannen kan het een tijdelijke onvruchtbaarheid veroorzaken. Dit herstelt zich weer als het middel gestopt is.
- Voor zover dit bekend is, kan Sulfasalazine in doseringen tot 2 gram zonder gevaar voor de vrucht, gebruikt worden tijdens de zwangerschap.
- Sulfasalazine kan in doseringen tot 2 gram tijdens de borstvoedingsperiode worden gebruikt. Het medicijn komt in kleine hoeveelheden in de moedermelk.

Het is belangrijk dat u uw reumatoloog vertelt dat u zwanger wilt worden, of al zwanger bent, of borstvoeding geeft.

### **Vragen en telefoonnummers**

Het is belangrijk dat u juiste en duidelijke informatie krijgt. Met deze informatie beslist u, samen met uw arts, over uw behandeling. Heeft u na het gesprek met uw reumatoloog en na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel deze dan gerust.

- Polikliniek reumatologie: (023) 224 0170
- Ook kunt u contact opnemen met een reumaverpleegkundige via het telefoonnummer van polikliniek reumatologie.

### **Waar zijn we te vinden?**

**Haarlem Zuid**  
Boerhaavelaan 22  
2035 RC Haarlem

(023) 224 0000

**Haarlem Noord**  
Vondelweg 999  
2026 BW Haarlem

[www.spaarnegasthuis.nl](http://www.spaarnegasthuis.nl)

**Hoofddorp**  
Spaarnepoort 1  
2134 TM Hoofddorp

[info@spaarnegasthuis.nl](mailto:info@spaarnegasthuis.nl)